



○性別での比較

50歳代までは女性が男性よりむし歯有病率がやや高く、60歳以上はあまり差を認めない。



むし歯有病者率（男女別）


（単位：％）

|          | 20歳代 | 30歳代 | 40歳代 | 50歳代  | 60歳代  | 70歳代  | 80歳以上 |
|----------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| 男性 (H17) | 92.4 | 98.1 | 98.2 | 97.1  | 91.4  | 90.2  | 74.5  |
| 男性 (H22) | 87.9 | 96.7 | 98.8 | 97.5  | 95.9  | 89.7  | 89.7  |
| 男性 (H28) | 87.5 | 95.4 | 99.0 | 98.7  | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 女性 (H17) | 97.8 | 98.5 | 99.6 | 100.0 | 96.3  | 84.9  | 65.8  |
| 女性 (H22) | 93.8 | 97.5 | 98.5 | 99.2  | 97.7  | 91.8  | 76.5  |
| 女性 (H28) | 90.1 | 97.7 | 99.3 | 100.0 | 99.1  | 100.0 | 100.0 |

## (5) 未処置歯の状況

### ○過去調査（平成17年度、平成22年度）との比較

多くの年代において前回の調査より未処置歯を有する者の割合は全体に減少傾向にあるが、前回の調査より20歳代、30歳代の増加は著明である。





(単位：%)

|          | 20歳代 | 30歳代 | 40歳代 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳以上 |
|----------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 鳥取 (H17) | 46.0 | 42.9 | 40.3 | 43.1 | 32.0 | 35.5 | 39.8  |
| 鳥取 (H22) | 37.9 | 31.9 | 36.4 | 35.5 | 33.0 | 30.9 | 27.5  |
| 鳥取 (H28) | 44.7 | 38.0 | 37.2 | 32.6 | 32.9 | 32.2 | 29.9  |
| 全国 (H23) | 43.1 | 38.8 | 35.0 | 35.0 | 36.0 | 37.5 | 36.6  |

## ○性別での比較

全ての年代において、男性の方が女性より多い。



一人平均未処置歯数（男女別）


（単位：本）

|          | 20歳代 | 30歳代 | 40歳代 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳以上 |
|----------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 男性 (H17) | 1.6  | 1.2  | 1.3  | 1.2  | 1.0  | 1.0  | 1.2   |
| 男性 (H22) | 1.6  | 1.7  | 1.8  | 1.3  | 1.0  | 1.0  | 1.3   |
| 男性 (H28) | 2.1  | 1.2  | 1.2  | 1.1  | 1.0  | 0.8  | 0.8   |
| 女性 (H17) | 1.1  | 0.8  | 1.0  | 1.0  | 0.5  | 0.8  | 0.9   |
| 女性 (H22) | 1.0  | 0.7  | 0.9  | 1.0  | 0.8  | 0.7  | 0.4   |
| 女性 (H28) | 1.3  | 0.9  | 1.0  | 0.8  | 0.8  | 1.0  | 0.6   |

## (6) 処置歯の状況

### ○過去調査（平成17年度、平成22年度）との比較

一人平均処置歯数は20歳代、30歳代、40歳代で減少傾向にあるが、50歳代以降では増加傾向にある。





(単位：本)

|          | 20歳代 | 30歳代 | 40歳代 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳以上 |
|----------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 鳥取 (H17) | 7.7  | 11.4 | 12.6 | 11.5 | 10.6 | 8.6  | 6.3   |
| 鳥取 (H22) | 7.4  | 10.6 | 13.0 | 13.2 | 12.3 | 10.6 | 8.2   |
| 鳥取 (H28) | 5.8  | 8.7  | 12.1 | 13.4 | 12.5 | 10.5 | 9.9   |
| 全国 (H23) | 6.0  | 9.9  | 11.7 | 12.5 | 11.0 | 9.2  | 6.4   |

## ○性別での比較

80歳以上を除くすべての年代において、女性の方が多い。



一人平均処置歯数（男女別）


（単位：本）

|         | 20歳代 | 30歳代 | 40歳代 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳以上 |
|---------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 男性（H17） | 6.9  | 10.6 | 11.9 | 10.5 | 9.3  | 8.7  | 7.9   |
| 男性（H22） | 6.3  | 9.9  | 12.2 | 12.1 | 10.3 | 10.5 | 9.7   |
| 男性（H28） | 5.6  | 7.5  | 11.3 | 12.2 | 12.5 | 9.9  | 11.9  |
| 女性（H17） | 8.4  | 12.6 | 13.6 | 12.8 | 11.8 | 8.5  | 5.3   |
| 女性（H22） | 7.9  | 10.9 | 13.4 | 14.1 | 13.8 | 10.7 | 7.4   |
| 女性（H28） | 5.9  | 9.4  | 12.6 | 14.0 | 12.6 | 10.9 | 8.6   |

## (7) 喪失歯の状況

### ○過去調査（平成17年度、平成22年度）との比較

喪失歯のある者の割合は、20歳代で9.9%、30歳代17.7%、40歳代32.2%、50歳代64.5%、60歳代85.6%と年代を追う毎に増加している。平成22年度調査と比較して40歳代、50歳代では顕著な減少が見られる。





(単位：%)

|          | 20歳代 | 30歳代 | 40歳代 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳以上 |
|----------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 鳥取 (H17) | 12.5 | 24.5 | 49.8 | 70.9 | 85.9 | 96.1 | 99.3  |
| 鳥取 (H22) | 5.6  | 14.3 | 38.7 | 70.3 | 83.1 | 89.0 | 95.8  |
| 鳥取 (H28) | 9.9  | 17.7 | 32.2 | 64.5 | 85.6 | 90.7 | 96.1  |

## ○性別での比較

過去の調査ではすべての年代において男性より女性の方が一人平均喪失歯数が多い傾向にあったが、今回の調査では50歳代、60歳代で女性よりも男性の方が一人平均喪失歯数が多かった。



一人平均処置歯数（男女別）


（単位：本）

|          | 20歳代 | 30歳代 | 40歳代 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳以上 |
|----------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 男性 (H17) | 0.2  | 0.5  | 1.4  | 3.1  | 8.4  | 13.4 | 16.6  |
| 男性 (H22) | 0.1  | 0.3  | 1.0  | 3.5  | 6.8  | 9.9  | 13.1  |
| 男性 (H28) | 0.2  | 0.3  | 0.5  | 2.8  | 5.9  | 9.8  | 12.4  |
| 女性 (H17) | 0.2  | 0.4  | 1.6  | 3.7  | 9.8  | 15.2 | 21.0  |
| 女性 (H22) | 0.1  | 0.3  | 0.9  | 3.0  | 5.6  | 11.0 | 17.2  |
| 女性 (H28) | 0.2  | 0.4  | 1.1  | 2.6  | 5.6  | 9.9  | 16.0  |

## (8) 補綴の状況

### ○前回調査（平成 22 年度）との比較

補綴を必要とする者が全体の50.6%で前回調査に比べてわずかに減少しているが、補綴完了者は全体の23.7%で前回調査に比べて10%減少している。




補綴の状況 (単位: %)

|          | 補綴完了者 | 一部完了者 | 未完了者 | 対象菌なし |
|----------|-------|-------|------|-------|
| 鳥取 (H22) | 33.1  | 9.1   | 9.3  | 48.5  |
| 鳥取 (H28) | 23.7  | 11.8  | 15.1 | 49.4  |

補綴完了者+一部完了者+未完了者+対象菌なしを100として算出

### ○補綴が必要な者の状況（平成 17 年度・平成 22 年度との比較）

過去調査では、増加傾向にあった補綴完了者が、今回調査で17.4%減少に転じた。



補綴が必要な者の状況 (単位: %)

|          | 補綴完了者 | 一部完了者 | 未完了者 |
|----------|-------|-------|------|
| 鳥取 (H17) | 58.3  | 18.7  | 23.0 |
| 鳥取 (H22) | 64.3  | 17.7  | 18.0 |
| 鳥取 (H28) | 46.9  | 23.4  | 29.7 |


補綴完了者+一部完了者+未完了者を100として算出



## (9) 歯周病の状況

### ○過去調査（平成17年度、平成22年度）との比較

歯周炎有病者率は年代を追う毎に増加して60歳代以降では50%以上が歯周病に罹患している。過去調査と比較して50歳代を除くすべての年代で増加傾向にあり80歳以上での増加が顕著である。



(単位：%)

|          | 20歳代 | 30歳代 | 40歳代 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳以上 |
|----------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 鳥取 (H17) | 14.1 | 14.8 | 22.4 | 35.4 | 43.7 | 41.5 | 30.5  |
| 鳥取 (H22) | 12.6 | 14.1 | 26.9 | 40.0 | 45.2 | 47.9 | 33.3  |
| 鳥取 (H28) | 15.5 | 19.0 | 31.1 | 37.3 | 50.3 | 52.5 | 48.1  |
| 全国 (H23) | 13.7 | 22.0 | 27.9 | 40.9 | 48.9 | 45.3 | 40.5  |


注) 歯周炎有病者率とは、4mm以上の歯周ポケットを有する者の割合

○歯肉の所見の有無

・前回調査（平成 22 年度）との比較

所見なしは年代を追う毎に減少している。コード 1 は特徴的な傾向は示さなかった。コード 2 は 20 歳代が最も多く以降年代を追う毎に減少している。コード 3、コード 4 はコード 2 とは逆に年代を追う毎に増加傾向にある。

前回調査との比較ではコード 2、コード 3、コード 4 ですべての年代において増加傾向にある。



(単位：%)

|       | 所見のあるもの |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 所見なし |      | 対象歯なし |      |
|-------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
|       | 総数      |      | コード1 |      | コード2 |      | コード3 |      | コード4 |      | H22  | H28  | H22   | H28  |
|       | H22     | H28  | H22  | H28  | H22  | H28  | H22  | H28  | H22  | H28  |      |      |       |      |
| 20歳代  | 56.7    | 65.8 | 18.3 | 15.2 | 25.8 | 35.1 | 11.8 | 13.7 | 0.8  | 1.9  | 42.2 | 34.2 | 1.1   | 0.0  |
| 30歳代  | 57.1    | 66.4 | 13.9 | 12.5 | 29.2 | 34.9 | 12.1 | 15.3 | 2.0  | 3.7  | 42.1 | 33.6 | 0.8   | 0.0  |
| 40歳代  | 67.1    | 72.0 | 14.4 | 11.5 | 25.8 | 29.4 | 20.4 | 22.3 | 6.5  | 8.8  | 31.6 | 28.0 | 1.4   | 0.0  |
| 50歳代  | 76.0    | 79.1 | 12.6 | 15.5 | 23.4 | 26.3 | 26.8 | 25.8 | 13.2 | 11.5 | 23.2 | 20.0 | 0.9   | 0.9  |
| 60歳代  | 76.1    | 84.0 | 13.3 | 12.0 | 17.5 | 21.7 | 29.5 | 32.4 | 15.7 | 17.9 | 19.7 | 13.9 | 4.2   | 2.1  |
| 70歳代  | 67.5    | 78.7 | 9.4  | 6.6  | 10.2 | 19.7 | 33.6 | 30.1 | 14.3 | 22.4 | 19.3 | 12.6 | 13.2  | 8.7  |
| 80歳以上 | 49.2    | 66.2 | 8.3  | 10.4 | 7.5  | 7.8  | 23.3 | 26.0 | 10.0 | 22.1 | 17.5 | 13.0 | 33.3  | 20.8 |

コード 0 歯肉に炎症の所見が認められない

コード 1 プロービング後に出血が認められる

コード 2 歯石の沈着（歯肉縁下 4 mm までのプロービングによる検出を含む）

コード 3 ポケットの深さが 4 mm 以上 6 mm 未満

コード 4 ポケットの深さが 6 mm 以上