


# 水稻栽培のポイント その2（中干し開始～終了まで）

発行日：令和4年5月20日 発行：大山営農センター 協力：大山普及支所

★収量と品質の両方を確保するため、水管理の基本をおさえましょう！

中干し開始茎数目安	植付け株間 22cm (坪50株)	植付け株間 18cm (坪60株)
コシヒカリ・星空舞	1株あたり 約19本	1株あたり 約16本
ひとめぼれ・きぬむすめ	1株あたり 約21本	1株あたり 約18本

栽培管理	↓ 草が残ったら 中期除草 (湛水散布)	中干し	↓ 草が残ったら 中期除草 (落水散布)	幼穂形成期
------	----------------------------	-----	----------------------------	-------



**④ 中干し**

☆中干しの目的

- ・ 過剰な分げつを抑制 ⇒ 良質茎の確保
- ・ 土に酸素を供給 ⇒ 根の健全化  
横根の発根促進
- ・ 土を固くする ⇒ 倒伏防止  
⇒ 作業性の確保

☆中干し開始時期の目安

- ・ 中干しは遅れないよう早めに開始する。
- ・ 田植後30日くらいで、1株の茎の本数（葉っぱが2枚以上出ているもの）を数え、品種ごとに違うので、上の表を目安に中干しを開始する。

☆中干しの程度

- ・ 排水口を開け、足跡に水がなくなるまで干す。（暗渠・あとを外し、できれば溝切をする。）
- ・ 中干しの終了は、田面に立ち、容易に歩ける程度の固さを目安とする。
- ・ それぞれの水田によって条件が違うので中干しの期間は違います。（右図：田面に軽くヒビが入り、田面に立つとクツあとが残るくらい）
- ・ 幼穂形成期（出穂1か月前）までに終了する。

**⑤ 走り水、間断かん水**

- ・ 中干しが終わったら、1~2回水をかけ流す（走り水）。
- ・ いきなり水をためると根腐れを起こす。
- ・ 走り水のあと、2~3cm程度水をためる、干すを繰り返す。

**中期除草**

- ・ 雑草が残っていたら、中期除草剤で対応する。
- ・ 水をためて使うタイプの除草剤は、中干し開始までに使う。
- ・ 中干しの時に雑草が残っていたら、水を落として使うタイプの除草剤を使う。（これ以降は使える除草剤が無いので最後のチャンス！）

