

## 沖合底びき網漁業の概要

かけまわし漁法という方法で海底に住むエビ、カニ、魚などを漁獲します。

【魚種】ハタハタ・ヒレグロ・アカガレイ・ソウハチ・ズワイガニ等

【漁場】山陰沖

【隻数】鳥取県に水揚げする主な稼動船数 鳥取県漁協賀露支所：6隻、

同網代港支所：10隻、田後漁協：8隻（2016年4、12月に1隻ずつ減船）

【漁法】まず浮標を投入し、図のように四角形を描くように船を走らせながら網を入れます。最後に浮標を引き揚げ、ひき網の一端を回収し、網をひきます。1回あたりの操業時間は約1時間半で、網を揚げた後、移動して次の操業位置を決め、前期同様の操業を昼夜を問わず繰り返し、1航海3～6日程度で帰港します。



### 2016年の漁獲状況

○賀露 漁獲量は1,901tで、漁獲金額は11.4億円でした（前年から2t増加、6千万円増加）。

○網代 漁獲量は2,000tで、漁獲金額は17.0億円でした（前年から8トン増加、1億2千万円増加）。

○田後 漁獲量は2,755tで、漁獲金額は18.1億円でした（前年から144トン減少、5千万円減少）。

○合計 漁獲量は6,656tでその内訳はハタハタ30%、アカガレイ18%、ズワイガニ14%、マダラ9%、ソウハチ9%でした。漁獲金額は46.5億円で、ズワイガニの割合が47%を占め、次いでアカガレイが17%、ハタハタ10%となりました（前年から179トン減少、1億1千万円増加）。



地区別魚種別漁獲量及び金額


## 現状の課題と解決に向けた取り組み

### 資源管理とブランド化の推進

本県のブランドとなっている松葉がにを漁獲するこの漁業は流通・観光産業への貢献度も高くなっています。しかしながら、現在の船団数は1989年

(平成元年) の52隻と比較して24隻まで激減しています。重要な漁業であるため、これ以上の廃業船を出さないようにしなければなりません。現在は収入的にズワイガニの漁獲に頼つており、更なるズワイガニの資源管理方策の提言が必要です。また、2015年漁期からトップブランド特選とつとり松葉がに「五輝星」を立ち上げ、ブランド力の強化を図るズワイガニを初め、ハタハタやカレイ類の魚価向上が重要となります。

この漁業が長い間続いているのは、漁業者自らの資源管理への取り組みによるものが大きいと考えられます。今後も引き続き漁業者と協力し合って漁獲サイズの制限など資源管理方策の検討、カレイを操業中にズワイガニを水中で脱出させる資源に優しい網の改良・普及、近年漁獲が増加しているマダラの船上加工等を推進します。



鳥取県沖合底びき網の漁獲量・金額・稼働隻数の年推移


## 沖合底びき漁業



### ズワイガニ (地方名 松葉がに・若松葉・親がに)

#### 生態

【分布】陸棚斜面の水深200～500mの海底に分布している。




【成長】ふ化から稚ガニになるまでは水深300m以浅を浮遊する。オス（最大甲幅約15cm）はメス（最大甲幅約9cm）より大きくなる。これは脱皮する回数がちがうためで、オスは12回程度、メスは10回程度脱皮する。

松葉がにと若松葉はDNAの分析等により同一種であることが確認され、若松葉は数回の脱皮で松葉がにとなる。

【成熟】産卵は毎年2～3月に行われる（初産のみ6～7月）。

【食性】ヒトデ、魚、イカ、貝などを食べ、時には共食いもする。



#### 漁業の特徴

【漁法】沖合底びき網漁業により漁獲される。


【漁期】雄は11月6日～3月20日（自主規制によって若松葉1月20日～2月末日）、雌は11月6日～1月20日（自主規制によって11月6日～12月31日）が漁期となる。

## 漁獲量と資源状況 中位横ばい

2016年漁期ズワイガニの水揚量

### 【松葉がにの減少について】

- 出雲沖の漁獲量は例年並みであったが、隠岐北方～東で漁獲量が減少
- 漁獲物が小型主体であったことも影響



### 【親がにの増加について】

- 前年に比べ漁船数が減少している中、資源状況が若干上向いているため漁獲量が増加

### 【若松葉がにの増加について】

- 調査では資源量が多かった出雲沖の漁場で操業する田後が、漁船数の減少も影響し、漁獲量が伸びなかった。しかし、鳥取沖で漁場形成が見られ、網代・賀露で順調な漁獲あり。また、前年に比べ漁獲物組成における大型ガニの比率が向上



### 漁期年比較

漁期年 (11-3月)	松葉がに (脱皮1年以上の雄)	若松葉がに (脱皮6ヶ月以内の雄)	親がに (雌)	計
2014	256	114	557	927
2015	248	116	560	925
<b>2016</b>	<b>230</b>	<b>137</b>	<b>569</b>	<b>937</b>
前年比	92.8%	118.2%	101.6%	101.3%



### 資源を大切に使うための取り組み

ズワイガニは生まれてから9～10年で12回脱皮を繰り返してやっと若松葉がにになります。さらに1～2年で商品価値の高い松葉がにとなります。若松葉がにや小さな松葉がにの漁獲量を抑えることで、数年後松葉がにの漁獲量を増やすことが大切です。今後、ズワイガニの資源を回復させるためには、若松葉漁獲自主規制を見直し、改良漁具の導入を急ぐべきであると考えています。なお、2016年漁期からは、鳥取、兵庫県の沖合底びき網漁船11月のカニ漁期に2日間以上休漁する自主規制を追加した資源管理を実践しています。




## 沖合底びき漁業

### アカガレイ (地方名 まがれい)



## 生態

【分布】能登半島から山口県沖合の水深150m～900m



【成長】雌の方が大型になり体長32cm、雄は22cm程度になる。

【成熟】成熟年齢は雄は2歳（15cm）、雌は5歳（25cm）。3月から4月に産卵する。

【食性】ゴカイ類、クモヒトデ、アミ類、イカ類などを食べる。

## 漁業の特徴

【漁法】沖合底びき網漁業により漁獲される。

【漁期】春に多く漁獲される。




## 漁獲量と資源状況 中位減少




2016年のアカガレイの漁獲量は1,231トンで前年より111トン減少しました。月別の漁獲量は、4,10,12月を除いて前年を下回りました。


体長組成を見ると、30cm前後の雌の漁獲割合が多く、稚魚の生き残りの多かった卓越年級群である2001～2005年級を中心とする複数年級群によって資源が支えられています。



体長組成




年別地区別漁獲量



月別漁獲量

## 資源を大切に使うための取り組み

鳥取県の漁業者は資源を保護するため、全長20cm未満のアカガレイを漁獲しないようにしています。




20cm未満は獲らない



水中ロボットカメラで撮影された  
かに牧場内のアカガレイ


## 沖合底びき漁業



### ソウハチ (地方名 いて、えて)

#### 生態

【分布】能登半島から山口県沖合の水深160m～250m



【成長】雄は5歳で25cm、雌は7歳で35cmになる。

【成熟】雄は2歳、雌は3歳で成熟する。1～3月に産卵する。

【食性】アミ類、キュウリエソ、イカ類など

#### 漁業の特徴

【漁法】沖合底びき網漁業により漁獲される。


【漁期】秋に多く漁獲される。




## 漁獲量と資源状況 中位減少

2016年の漁獲量は571トンで前年より19トン減少しました。月別の漁獲量は、3, 5, 11月は前年を上回ったものの、1月は前年を大きく下回りました。


漁獲物組成を見ると、全長20, 25cm前後の雌、全長19-20cmの雄の漁獲割合が多く、前年に比べ3歳魚（2013年級群）の加入が良好だったことが伺えます。



体長組成



年別漁獲量





月別漁獲量

## 資源を大切に使うための取り組み

2010年からの稚魚調査結果から、採集された全長7cm以下のソウハチが翌年、翌々年に漁場に加入すると推定し、海域面積で重み付けした加入量指数と漁獲量の関係から、2017年の漁獲量予測を算出したところ、543トンとなりました。

まだ調査期間が短く、データ数が少ないため、今後も稚魚調査を継続し、予測精度を向上させていきます。




## 沖合底びき漁業

### ハタハタ (地方名 白はた)



#### 生態

**【分布】** 日本海（日本海西部系群 山口県～石川県沖合）の水深約150～300mに分布する。また秋田県周辺を産卵場とする日本海北部系群の一部も日本海西部に来遊する。



**【成長】** 寿命は5歳

**【成熟】** 朝鮮半島北東部沿岸で産卵を行う。

**【食性】** ヨコエビ、アミ類などを食べる。

#### 漁業の特徴

**【漁法】** 沖合底びき網漁業により漁獲される。




**【漁期】** 春と秋に多く漁獲される。



## 漁獲量と資源状況 中位増加

2016年の漁獲量は2,014トンで前年より368トン増加しました。月別の漁獲量は、4,5,11月は前年を下回ったものの、他の月は前年を上回りました。

漁獲物組成を見ると、2歳魚（雌：体長15cm前後、雄：体長13cm前後）、3歳魚（雌：体長18cm前後、雄：体長16cm前後）を主体とした漁獲であった。



## 資源を大切に使うための取り組み

これまでハタハタの漁獲量が低調で推移していたため網の目合を小さくしたままであり、小型魚が漁獲あるいは投棄されやすい状況にあります。ハタハタの小型魚は（ジンタン、6番および5番）単価が5円（1尾あたり）以下と非常に安価であり。大量に漁獲しても経費に見合う漁獲金額を稼ぐことはできません。

一方、体長15cm（4番）以上になると体長が1cm大きくなるごとに単価が2倍高くなっています。つまり、1年保護して2歳魚以上になってから漁獲する方が、経済効率が高くなります。加えて、親魚の保護につながり、産卵量、発生量を増加させることになるため資源回復の一助となります。小型魚を保護するために目合を大きくすることが大切です。

**全長15cm未満のハタハタを半分逃がすためには8節（約4.5～5cm）の網目が適当**




**8節網の使用**

# とろはたの紹介


脂質測定器で脂ののりを測定



体長別の脂ののり



大型ハタハタの脂ののり



○ハタハタの脂ののりを抽出測定しました。

(2008年)

○最大18.6%、最小3.2%、平均9.8%あり、人が美味しいと感じる10%程度ありました。

○月別に変化は見られず、体長が大きくなるにつれて脂がのる傾向が見られました。



大きいハタハタはより美味しい！

○大型ハタハタ（体長18cm以上、水揚げ発泡「特大」「①番」）の脂ののりを鳥取県産魚PR推進協議会と一緒に脂質測定器で測定しました。（2009年漁期）

○水揚げ期間中を通してほぼ10%ありました。



美味しさに自信あり！

脂ののりに自信のある全長20cm以上の鳥取県産大型ハタハタを  
「とろはた」としてブランド化（平成22年10月～）



専用箱とシールを貼って差別化



とろはた料理



築地の市場関係者へも説明・試食・RP(22年度)



麻布十番でのPR(23年度) 秋田県と共同開催



築地本願寺でのPR(24～26年度) 秋田県と共同開催

## べにずわいかご漁業の概要

この漁業は知事許可漁業として操業されていましたが、平成2年に施行された「べにずわいがに漁業の取締に関する省令」による大臣承認漁業を経て、平成14年、「指定漁業の許可及び取締り等に関する省令」中で、「日本海べにずわいがに漁業」として位置づけられ、大臣指定漁業となりました。なお、資源の回復を図るために策定した「日本海沖合ベニズワイガニ資源回復計画」に基づき、全船で実施されていた6月（30日間）の追加休漁に代わる措置として、平成19年9月から、日本ではじめて船舶ごとの年間漁獲量の上限を設定（個別割当て方式）しています。


【魚種】ベニズワイ

【漁場】山陰沖、日本海中央部

【隻数】境港に水揚げする稼動船数 鳥取：3隻、島根：6隻、新潟：2隻

【漁法】幹縄に約50m間隔にかにかごを180個取り付けた漁具を数セット用いる「かにかご漁業」により水深800m以深でベニズワイを漁獲する。水揚げされたカニは船上で、コンテナに大きさ及び質別に選別され、船倉内で氷蔵保管される。出港から入港までの1航海は約一週間である。

【漁期】7～8月は禁漁となっている。



- 網目 網目の内径の長さ15cm以上、かごの側面最下部に形成される菱形状の網目の対角線の長さ(縦、横とも)10cm以上。

※大臣許可においては、上記に問わらず、かごの側面最下部に内径9.5cmの円形脱出口を3個以上設けたかごについては、網目の内径の長さ13cm以上。

## ベニズワイ (地方名 ベニ、ベニガニ)




## 生態

**【分布】** 主に日本海（水深約500～2,700m）

**【成長】** オスは甲幅が最大約15cmに達する。  
寿命は10年以上。メスは採捕禁止。

**【成熟】** 2～4月、隔年産卵で抱卵期間は約2年

**【食性】** ヒトデ、魚、イカなどを食べる。




## 水揚量と資源状況


資源状況  
中位横ばい

2007年(平成19年)9月以降、漁船毎に漁獲割当量（上限）が決められたため、各船が計画的に漁獲を行っています。このため、近年の境港における水揚量は約8千トンから9千トンで推移しています。

境港におけるベニズワイ水揚量の推移



また、銘柄「小」として水揚げされたベニズワイは、資源回復に取り組みを開始した頃から、年々徐々に平均甲幅が大型化してきています。



境港に水揚げされる「小B」銘柄ベニズワイの平均甲幅の推移




## 資源を大切に使うための取り組み

1990年代から資源が減少し始め、さらに1999年に日韓暫定水域が設定され漁場が狭められたため、水揚量の減少に拍車がかかったうえ、カニの大きさも小型化しているという問題がありました。2005年(平成17年)より日本海沖合ベニズワイガニ資源回復計画が漁業者(島根、鳥取、兵庫、新潟県)により実施され、漁獲努力量の削減、減船、改良漁具(リング(小型ガニの脱出口)付きかご)の導入が行われています。

漁業者と水産試験場による共同研究調査では、リング付きかごを使用した場合、漁獲規制サイズである甲幅9cm未満の小型個体の脱出効果があり、資源回復に良いことが確認できました。

また、同時に行った3cm目合試験籠で、漁場別に大きさ毎の資源の水準を算出して動向を追跡しています。

今後もこのような共同調査を続けていき、資源回復に向けた取り組みを継続していくことが大切です。



小さいカニはリングから逃げる！！



図 3cm目合籠での1籠当の平均漁獲尾数の推移

## 沿岸漁業の概要

漁船の大きさが5トン未満の比較的小規模な漁業経営体が大半を占めます。2015年12月末時点で県内の沿海漁業協同組合員数（正・准組合員数）のうち沿岸漁業に従事している人数は、1,169人（前年同時点の1,218人から49人減少）で全体の88.0%にあたり、県内沿岸域のほぼ全域の18地区（3市5町）で操業しています。

主な漁業種類と漁獲対象種は、一本釣によるスルメイカ、ケンサキイカ（白いか）、サワラ等、さし網によるアジ類、サワラ、ブリ類、タイ類等、小型底びき網によるカレイ類、ヒラメ等、潜水によるイワガキ、ザザエ等で、回遊魚主体に多種多様な魚貝類が漁獲されています。

### 漁獲状況


近年の漁獲量（漁獲金額）は、約7,500トン（約35億円）で推移していましたが、2012年以降、漁獲量（漁獲金額）は、約6,000トン（約30億円）に減少し、2016年は5,774トン（35.4億円）と漁獲金額は若干回復したものの、漁獲量は低水準にあります。この要因の一つにはスルメイカの不漁が挙げられます。

漁法別に見ると、一本釣（イカ釣含む）による漁獲が全体の42.9%を占め、その他、刺網、小型定置網、小型底びき網、潜水の割合が高く、これらが沿岸漁業の主な漁法となっています。

### 賀露地方卸売市場でのセリ模様



沿岸漁業の漁法別漁獲量・金額の推移  
(直近10年間)



### 2016年の漁法別漁獲量・金額及びその割合

漁法	漁獲量		金額	
	トン	%	億円	%
一本釣(19tイカ釣含む)	2,474	42.9%	17.5	49.5%
刺網	995	17.2%	4.8	13.5%
小型定置網	400	6.9%	2.0	5.7%
小型底びき網	176	3.0%	0.9	2.6%
潜水・磯見	291	5.0%	2.6	7.3%
その他	1,438	24.9%	7.5	21.3%
計	5,774		35.4	

## イカ釣漁業

26ページを御参照ください

## 刺網漁業



【魚種】アジ類、サワラ、ブリ類、タイ類等

【漁場】県内沿岸（人工魚礁、天然礁等）

【漁法】さし網は、漁獲しようとする魚類が通過する場所を遮断するように網を張り、網目に刺さらせたり、絡ませたりして漁獲する固定式刺網と、魚礁や天然礁等で形成される魚群を巻き獲る狩さし網があります。主に1~3人で、夜間に操業します。



ハマチ(ブリ若魚)さし網の操業模様





さし網の模式図

## 小型底びき網漁業

【魚種】カレイ類、ヒラメ等

【漁場】県内沿岸（砂浜域）

【漁法】小型底びき網は、10mのケタ棒で網口を広げ、海底で網を引っ張って底魚類を獲ります。主に1人で、夜間に操業します。



上図：小型底びき網の操業の模式図  
左図：小型底びき網（境港）の操業模様  
右図：停泊中の小型底びき網漁船（境港）


## 沿岸漁業

# ヒラメ (地方名 ひらめ、おおくちがれい)



## 生態

**【分布】** 日本周辺をはじめ、北はサハリンから南は南シナ海までの砂底、砂礫など の沿岸域に広く分布する。



**【成長】** 1年で全長25~30cm、2年で36~46cm、3年で44~58cm、4年で47~67cm、5年で49~73cm程度に成長する。最大で100cmになり、10kgを超えるような個体もいる。


**【成熟】** 2歳で約半数が産卵し、3歳で全ての魚が産卵する。鳥取沿岸では3~4月が産卵期となる。

**【食性】** 稚魚から幼魚はアミ類、かいあし類、端脚類などの小型甲殻類を主に捕食するが、成長に伴い、カタクチイワシなどの魚類、エビ類、イカ類などのより大型の生物を餌にする。

## 漁業の特徴

**【漁法】** 小型底びき網、一本釣、刺網、定置網、沖合底びき網等様々な漁法で漁獲される。

**【漁期】** 周年漁獲される。




ヒラメの成長(2007金丸らから引用)

## 漁獲量と資源状況 低位横ばい

漁獲量は1996年以降急激に減少し、2000年には34.5トンにまで減少しました。その後、緩やかな増加傾向にありましたが、2008年以降、低調な漁獲が続いています。2016年の漁獲量・金額は、64トン、79百万円で前年の59トン、68百万円よりわずかに増加しました。2010年から魚価は回復傾向でしたが、2013年から再び減少に転じました。その後、2015年の平均単価は増加し、1,230円/kgとなりました。

## ヒラメの漁獲量・金額の推移



## 資源を大切に使うための取り組み

2017年漁期は、漁獲主体である1~3歳魚（2014~2016年級群）の発生状況は依然として低いため、漁獲量は現状の低水準レベルの60トン前後になると予測しています。今後も全長25cm以下を再放流し小型魚を保護する取り組みを継続することで資源を回復させることが大切です。


また、1995年以降の漁獲量の減少要因とされるネオヘテロボツリウム症（吸血虫症）の蔓延状況を調査しています。2016年の感染率は9月に増加し始め、例年並みとなりました。依然としてヒラメ資源へのネオヘテロボツリウム症の悪影響が懸念されます。

ところで、2014年から美保湾地域栽培漁業推進協議会が事業主体となり、自県生産したヒラメを放流しています。試験放流期間を含めた2007~14年放流群の平均回収率は11%と良好な結果を得られました。



## 美保湾におけるヒラメ試験放流の年別回収率

	放流日	目的	放流尾数 (尾)	回収尾数 (尾)	回収率	追跡必要年数	放流尾数・サイズ(全長)
2007年放流群	淀江:6/19 境港:6/23	可能性の検討	60,700	9,802	16.1%	完了	淀江:30,700尾(平均103mm) 境港:30,000尾(平均104mm)
	淀江:6/24 境港:6/28		61,100	2,120	3.5%	完了	淀江:31,500尾(平均104mm) 境港:29,600尾(平均109mm)
2009年放流群	淀江:6/23 境港:6/27	地区間の比較	57,100	2,069	3.6%	完了	淀江:32,100尾(平均100mm) 境港:25,000尾(平均108mm)
	淀江:6/16 境港:6/19		68,610	10,707	15.6%	完了	淀江:34,150尾(平均87mm) 境港:34,460尾(平均91mm)
2011年放流群	境港: 7/2,7/19	環境収容力の把握(従来の2倍) ※地区的漁獲尾数相当	56,500	5,858	10.4%	完了	平均115mm
2012年放流群	淀江:6/16 淀江・皆生:6/19	環境収容力の把握(従来の2/3)	63,000	11,612	18.4%	完了	淀江・皆生:42,000尾(平均99mm) 境港:21,000尾(平均95mm)
2013年放流群	淀江・皆生:6/11 境港:6/15	小型化(種苗費削減)の検討	76,000	7,982	10.5%	完了	淀江・皆生:44,000尾(平均79mm) 境港:32,000尾(平均93mm)
2014年放流群	淀江・皆生、境港: 4/9	放流事業化(早期・少量放流)	30,000	4,155	13.8%	あと1年	淀江・皆生:10,000尾 境港:20,000尾(平均110mm)
2015年放流群	淀江・皆生、境港: 5/9	放流事業化(小型化・早期・前年の2倍放流)	60,000	4,158	6.9%	あと2年	淀江・皆生:20,000尾 境港:40,000尾(平均87mm)
2016年放流群	淀江・皆生、境港: 4/27	放流事業化(小型化・早期放流)	60,000	412		これから	淀江・皆生:20,000尾 境港:40,000尾(平均86mm)
07-14平均			59,126	6,788	11.5%		

## 稚魚分布密度と漁獲量の推移



## ネオヘテロボツリウム症の年別感染率




## 沿岸漁業



### サワラ (地方名 さわら、さごし：未成魚)

#### 生態

**【分布】** 東シナ海から黄海、渤海、さらに北海道以南の日本海に広く分布する。



**【成長】** 半年で約45cm、1年で約56cm、2年で約73cm、3年で約86cmに成長する。寿命は6歳程度と推定される。なお、鳥取県沖では3歳魚までしか確認されていない。

**【成熟】** 1歳で一部が産卵し、2歳で全て産卵するが日本海での産卵はほとんどなく、東シナ海等に南下して産卵する。


**【食性】** 魚食性が非常に強い

#### 漁業の特徴

**【漁法】** 弔縄釣、刺網、定置網等の漁法で漁獲される。

**【漁期】** 周年漁獲されるが、4~6月の漁獲量は少ない。

#### サワラの成長(鳥取県)



## 漁獲量と資源状況 高位減少


漁獲量は1998年以降、増加傾向にあるものの、2014年からやや減少し、2016年は漁獲量434トン、漁獲金額3.0億円と過去3番目の水準になりました。

鳥取県で漁獲されるサワラは、0~3歳魚で、主体は1歳魚です。


また、サワラ資源は、サワラが日本海で産卵しないため、東シナ海からのサゴシ（未成魚）の来遊に依存します。このことから、日本海中西部で漁獲量の多い京都府、福井県のサゴシの漁獲量から翌年の鳥取県の漁獲量が推定可能で、2017年の鳥取県の漁獲量は、約470トンと推定されます。2016年に日本海に来遊したサゴシは非常に多く、漁場形成されれば漁獲量は多くなりそうです。



### サワラの漁獲量・金額の推移



京都府、福井県のサゴシの漁獲量と鳥取県のサワラの漁獲量の関係及び漁獲量の推定



### 資源を大切に使うための取り組み

サワラの資源構造や回遊生態等についてはまだ不明な点が多く、沿岸漁業者への資源管理方策の提言や、効率的な漁獲に必要な漁況予測を行うことが困難となっています。そこで、鳥取県栽培漁業センターでは、2009~11年に日本海におけるサワラの基礎生態の解明ため、日本海側の関係府県（青森県～長崎県）と連携して、標識放流による回遊等の把握や市場調査等による漁獲物組成の把握を行いました。


なお、連携調査は終了しましたが、まだ産卵親魚の回遊ルートなど不明な点があるため、引き続き標識放流を行います。標識が付いたサワラが揚がった際には、栽培漁業センター野々村（電話0858-34-3321）まで御連絡ください。

## マダイ (地方名 まだい、たい)



### 生態


**【分布】** 北海道以南から尖閣諸島、朝鮮半島南部、東シナ海、南シナ海、台湾の水深30~200mの岩礁や砂礫、砂底などに広く分布する。



**【成長】** 1歳で約14cm、2歳で約22cm、3歳で約30cmに成長する。寿命は約20年と推定される。

**【成熟】** 3歳で約半数が産卵し、4年後に全て産卵する。鳥取沿岸では4~5月に産卵期となる。

**【食性】** 稚魚はかいあし類、尾虫類を、当歳魚はヨコエビ類やアミ類、成魚は甲殻類や貝類、多毛類などを主要な餌にする。



マダイの成長(2007日本海西部・東シナ海系群の資源評価から引用)

### 漁業の特徴

**【漁法】** 刺網、一本釣、小型底びき網、定置網等様々な漁法で漁獲される。

**【漁期】** 周年漁獲される。

## 漁獲量と資源状況 中位減少

漁獲量（漁獲金額）は、2004年の89.1トン（0.7億円）から2008年の240.8トン（1.7億円）まで増加し、その後、180トン台で安定していました。しかし、13年以降は、減少傾向にあります。

16年は、13～15年の稚魚の発生状況は良好だったにも拘わらず減少し、101トン（0.73億円）となりました。


また、マダイの単価は1994年から下落し、2010年も555円/kgまで低下しました。その後、魚価の回復が見られていたものの、最近では横ばいとなっています。2016年は前年とほぼ同額の730円/kgとなりました。

### 資源を大切に使うための取り組み


漁業者は自主規制により尾叉長13cm以下を再放流し、小型魚を保護しています。

小型底びき網の試験操業により、マダイ稚魚の発生量を調査しています。この調査結果から2017年の漁期は、13～16年の稚魚の発生状況は良好なことから、小型主体ですが、漁獲量は増加する見込みです。


### マダイの漁獲量・金額の推移



### マダイの単価の推移



### 鳥取県中部における6、7月のマダイ稚魚分布密度と鳥取県漁獲量の推移




## ナガレメイタガレイ (地方名 ばけめいた)



### 生態

**【分布】** 東北地方南部から東シナ海南部の水深150m以浅の砂泥域に分布する。特に水深70~100mに多く分布する。



**【成長】** 最大で30cmになる。

ナガレメイタガレイ稚魚

**【成熟】** 2歳で産卵する。鳥取沿岸では1~4月に産卵する。

(採集5月、全長約6cm)

**【食性】** 多毛類や甲殻類を餌にする。



### 漁業の特徴

**【漁法】** 小型底びき網等の漁法で漁獲される。

**【漁期】** 周年漁獲される。

## 漁獲量と資源状況 低位横ばい ➔

漁獲量は2005年に43.0トンまで落ち込みましたが、2007年には118.0トンまで回復し、漁獲金額も75百万円となりました。

しかし、その後の稚魚発生量が低水準であったことから、漁獲量は低位で推移し、12年には、漁獲量（漁獲金額）が14.5トン（11百万円）となりました。その後、微増したものの、2016年の漁獲量（漁獲金額）は過去最低の8.1トン（9百万円）となり、依然として資源状況は低位で推移しています。

### 資源を大切に使うための取り組み


稚魚の発生量調査と市場調査から当歳魚（その年生まれの魚）の漁場への加入状況を予測しています。2017年漁期は、漁獲主体となる1歳魚に当たる16年級群の稚魚の発生状況が2013年と同様の比較的高い水準なことから、2016年の漁獲量より増加する見込みです。

漁業者は自主規制により全長14cm以下を再放流し、小型魚を保護していますが、状況により網目拡大等の資源管理措置を提言していきます。


また、ナガレメイタガレイは、1~3月の平均水温と稚魚の発生量の上限に相関があり、海水温が低い年は、発生量が多くなる可能性があります。17年の水温は、3月時点までは例年より高く推移しており、稚魚が発生し辛い水温環境ですので、引き続き稚魚の発生が少ない可能性があると考えています。

### ナガレメイタガレイの


#### 漁獲量・金額の推移



### 5、6月のナガレメイタガレイ稚魚分布密度と鳥取県漁獲量の推移




### 6月のナガレメイタガレイ稚魚分布密度と1~3月の平均水温の相関



## 沿岸漁業

### キジハタ (地方名 あこう、あかみず)



#### 生態

**【分布】** 青森県以南から台湾の岩礁地帯に生息する。鳥取県においては県下全域の岩礁帯に生息しているがその数は少ない。

**【成長】** 1歳で約17cm、2歳で約21cm、3歳で約27cm、4歳で29cm、5歳で約37cmに成長する。最大で全長50cm程度になる。

**【成熟】** 小型の間は全て雌で大きくなるにつれて雄に性転換するという特性（雌性先熟と言う）がある。3年ぐらい経つと本格的に産卵し始める。

**【食性】** 肉食性であり、甲殻類（特にエビ類・カニ類）や魚類を好んで食べる。特に全長25cm以上になると魚類をよく食べるようになる。

#### 漁業の特徴

**【漁法】** 主に一本釣で漁獲される。

**【漁期】** 5月～10月に漁獲される。

#### 漁獲量と資源状況 高位減少




2016年から漁業者により、県下統一で全長27cm未満を再放流する取り組みが開始されたにも関わらず、漁獲量は11トン（22百万円）であり、1992年以降では4番に多い漁獲量と漁獲額でした。

#### 資源を大切に使うための取り組み

鳥取県の漁業者は、自主規制により全長27cm未満を再放流し、小型魚を保護しています。

また、2016年度から漁業者によるキジハタ稚魚の放流事業が本格的に始まっています。

全長27cm未満の個体の再放流にご協力をお願いします。



#### キジハタを増やそう

全長27cm未満のキジハタ(あこう、あかみず)は  
海へ、かえしましょう



- キジハタを増やすため鳥取県では漁業者自らが稚魚を放流しています。
- 27cm未満のキジハタを釣られた方は再放流にご協力ください。

鳥取県キジハタ栽培漁業推進協議会・鳥取県水産課  
鳥取県栽培漁業センター・(公財)鳥取県栽培漁業協会

## 沿岸漁業

### ソディカ (地方名 赤いか)

赤いかは、釣り上げ時は赤色ですが、釣獲後、少し時間が経過すると一度白くなって、その後、また赤くなります。



## 生態

**【分布】** 日本では沖縄諸島周辺が主な生息域で、山陰沖へは対馬暖流に乗り来遊し水深130~250mの水深帯域に分布する。

**【成長】** 胴長85cm、体重20kgになる最大級の食用イカで、寿命は1年である。

**【食性】** スルメイカや魚類等を餌にする。

## 漁業の特徴


**【漁法】** 樽流し立縄漁で漁獲される。

**【漁期】** 9~12月



### 樽流し立縄漁

イカが付くと樽が立つ




### 漁獲量と資源状況 低位増加

漁獲量（漁獲金額）は、1998年の580トン（2.2億円）以降、減少傾向にあり、2011年は14トン（0.1億円）まで減少しました。

15年は僅か4トン（5百万円）でしたが、16年は126トン（79百万円）と前年比で約30倍漁獲量が増加しました。

### ソディカの漁獲量・金額の推移




### ソディカの漁獲量予測の取り組み

山陰沖のソディカの漁獲量は、稚イカが来遊し始める6月の対馬海峡周辺の環境条件や、漁期直前の鳥取沖の水温と密接な関係があり予測が可能で、8月の漁場水温から漁獲量を予測しています。予測結果は、7月下旬~8月上旬に提供しますので、是非ご活用ください。

#### ソディカ(赤いか)の予測(速報版)

H28.7.28 載垣漁業センター

■栽培漁業センターの今期の漁獲予測(7月時点)  
今漁期の漁獲は「平年より多くなる」見込み。  
(過去10年間平均漁獲量: 112トン、今漁期予測: 約150トン)



- 8月の長尾崎沖水深185m地点の水深100m層の水温と赤いか漁獲量との相関関係からある程度の推測が可能。
- 7月19日の観測では、既に水温が17.0°Cあり(過去10年間の8月の平均水温16.4°C)、約150tの予測となる。
- さらば水温の上昇があれば、予測漁獲量も上積みになる。(例年、7月から8月までに1.5°C程度上昇することが多い)
- ただし、予測精度はまだ低い。

#### ■兵庫県但馬水産技術センターの長期予測

- 今漁期(9~11月)は、過去10年平均と比べて「平年並み」の漁獲となる見込み。
- 冷水塊の通り出しはやや小さく、漁場形成は平年よりいやや沖合にまで広がる見込み。

兵庫県尼崎水産技術センターHP  
「平成28 年度日本海ソディカ(赤いか)長距離予報」より  
[http://www.youyu-uogigai.jp/torimeseisaku/syousyou/T\\_rehimeisaku%20forecast%202016-1.pdf](http://www.youyu-uogigai.jp/torimeseisaku/syousyou/T_rehimeisaku%20forecast%202016-1.pdf)

#### ■その他参考情報(県内)

- 漁獲＆目撃情報  
7月上旬前後に小型の赤いか(胴長20~30cm程度)が赤崎沖に来遊していた様様  
※赤いか漁の際に目撃や混獲有り。「姫魚」の中的一部分に混じっていたこともある。  
(赤崎町漁協漁業者及び漁業団員からの聞き取り)
- 試験船による臨時調査  
漁獲なし

※ 7月の水温から漁期が前倒になる可能性があることから実施した臨時の調査。ただし、局所的・限定期的な調査(7/25長尾崎沖水深200~220m、12樽)

これまで、お問い合わせに実施している漁期前試験採集や8月中旬下旬の水温情報を元に検討し、情報提供してまいりましたが、漁期開始が前倒しになる可能性もあるため、認知点(7月28日現在)までに必要な・分析している情報を提供するものです。  
なお、8月下旬にあらためて、情報提供する予定です。  
赤いかの来遊に関する情報をお持ちの方は載垣漁業センターまでお知らせください。  
(電話0858-34-3321、畠田)

## 沿岸漁業

### サザエ (地方名 さざえ)



#### 生態

【分布】 北海道南部から九州の潮間帯下部～水深20mの岩礁域に分布する。

【成長】 1歳で殻高1cm、以後毎年1～2cmずつ大きくなり、5歳で8cmに成長する。

【食性】 海藻類を餌にする。



#### 漁業の特徴

【漁法】 潜水（素潜り、ボンベ潜水）、貝突き（かなぎ漁）及び刺網で漁獲される。

【漁期】 周年漁獲されるが、5月、7月、8月に多く漁獲される。 **中位横ばい** ➡

1991年の漁獲量37トンが2002年には311トンまで増加しましたが、その後減少し、近年では100～150トン程度で推移しています。

2016年の漁獲量（漁獲金額）は148トン（0.80億円）となりました。また、単価は542円/kgとなりました。


近年の漁獲量減少の背景には、藻場の減少による資源量の減少が懸念されています。特に深場で操業する刺網の漁獲量の減少が著しく、現在、栽培漁業センターでは、深場の藻場造成の手法開発に取り組んでいます。

#### 資源を大切に使うための取り組み


サイズ制限（殻蓋2.5cm）や操業時間の短縮、外敵駆除等、漁獲についての取り組みが行われています。

※鳥取県全体で40万個程度の稚貝を放流

サザエの漁獲量・金額の推移



サザエの単価の推移



サザエの稚貝



## クロアワビ・メガイアワビ

### 生態

**【分布】** 日本海から九州南部の潮間帯～水深30mの岩礁域に分布する。

**【成長】** 2歳で殻長5cm、4歳で殻長10cmになり、最大殻長20cm程度まで成長する。

**【成熟】** 11月から12月に成熟するが、近年春先に成熟している個体も確認され

### 漁業の特徴

**【漁法】** 潜水により漁獲される。

**【漁期】** 周年漁獲されるが、4月から8月に多く漁獲される。

### 漁獲量と資源状況 高位横ばい ➔

漁獲量は1990年代後半から増加して、2006年には13.1トンに達しました。その後は減少に転じ、2016年の漁獲量（漁獲金額）は10.2トン（67百万円）となりました。

また、単価は6,579円/kgで過去15年間で最も高くなりました。

県東部におけるクロアワビ、メガイアワビの漁獲は概ね5:1の割合となっています。


### 資源を大切に使うため取り組み

1988年から放流事業が行われ、殻長3cmに育てた稚貝が放流されており、回収率は約3割となっています。


2003年からは稚貝の害敵生物（ヒトデ、タコ等）の駆除や放流適地（稚貝の生息場所となる岩の隙間）への潜水による放流を行い、資源増大の取り組みが行われています。

※鳥取県全体で13万個程度の稚貝を放流

アワビ類の漁獲量・金額の推移



アワビ類の単価の推移



アワビの稚貝

## 沿岸漁業

### イワガキ (地方名 いわがき、ブランド名 夏輝)



#### 生態

【分布】陸奥湾から九州、日本海側の水深40m以浅の岩礁域に分布する。

【成長】3歳で殻高10cm、4歳で13cm、5歳で14cmに成長する。

【成熟】7月から10月に成熟し、ふ化後2年の殻高8cm程度から産卵する。

#### 漁業の特徴

【漁法】潜水により漁獲される。


【漁期】6月から8月に漁獲される。

#### 漁獲量と資源状況 中位横ばい ➤


大半を天然礁で漁獲していた1980年代の漁獲量は50トン程度でしたが、人工構造物の設置による漁場の増大で1990年代の漁獲量は増加し、2000年には266トンとなりました。しかし、近年は170トン前後で推移しています。2016年の漁獲量（漁獲金額）は167トン（1.12億円）となりました。また、単価は670円/kgで近年上昇傾向にあります。

現在、人工構造物での漁獲が少なくなっているとの漁業者の声もあり、漁獲量の減少が危惧されています。

イワガキの漁獲量・金額の推移



イワガキの単価の推移



#### 資源を大切に使うための取り組み

サイズ制限（殻高10cm以上、または重量200g以上）や操業時間の短縮等、漁獲についての取り組みが行われています。

また、2006年からは殻長13cm以上の高品質なイワガキには「夏輝（なつき）」のラベルを付け、ブランド化して販売しています。



夏輝(なつき)

沿岸漁業

**バイ** (地方名 黒ばい、本ばい、きんこばい)



牛熊


**【分布】** 北海南部から九州の砂泥域に分布する。島取では美保湾に多く分布する。

**【成長】** 約1年で殻高3cm、2年で4.5cm、3年で5.5cmに成長する。

**【産卵】** 海底の固着物に約1~2万粒の卵塊を数回に分けて産卵する。

**【食性】** 死んだ生き物の肉等を餌にする。

## 漁業の特徴



**【漁法】** かご網、小型底びき網で漁獲される。

**【漁期】**周年漁獲されるが、かご網が行われる

3月から9月に多く漁獲される。

## 漁獲量と資源状況 高位横ばい ➤

1970年、1971年の漁獲量は80トン以上あったが、環境ホルモン（有害な有機スズ）の影響で1980年代後半には数トンまで減少しました。その後、漁場環境が改善したことにより漁獲量は増加し、近年は60トン前後で推移しています。2016年の漁獲量（漁獲金額）は69トン（60百万円）となりました。


#### 資源を大切に使うための取り組み

鳥取県バイ資源回復計画の自主規制に基づき休漁期（10月から2月）の設定、サイズ制限（殻高3cm）、保護区の設定、カゴ数制限の取り組みが行われています。

また、天然母貝の産卵を促進させる産卵器の設置も行われており、栽培漁業センターでは産卵器設置情報（設置方法、設置時期）の提供を行っています



産卵器に付着した卵塊



バイ産器設置情報

平成28年6月5日

下さる。産卵器の設置方法と今年の設置時期情報をお知らせします。

- ・産卵器の設置を大原則のみ、1月15日～17日までに終えて下さい。
- ・設置場所は、複数のモードルの種類によって設置場所が異なります。

- ・設置して約10日後、産卵の有無を確認して下さい。
- ①付着していた場合、小化が終わるまで設置し続けて下さい。
- ②付着していなかった場合、次の大雨前の6月30日～7月2日までに再び設置して下さい。

【産地・孵化】  
・大西洋沿岸上陸で産卵を行う  
・水温20℃以上で産卵を行う  
・大西洋の沿岸と日本近海に分布。  
・日本では、北海道、本州、四国、九州  
・産卵期：5月～7月上旬まで

【孵化】  


【水温】							【影象】									
水温(°C)	——昨日 2012-04-15(日)	——今日 2012-04-16(月)	——明日 2012-04-17(火)	——后日 2012-04-18(水)	——次日 2012-04-19(木)	——翌日 2012-04-20(金)	——翌々日 2012-04-21(土)	——翌々々日 2012-04-22(日)	月	火	水	木	金	土	日	
20.8	20.8°C	20.9°C	21.0°C	21.1°C	21.2°C	21.3°C	21.4°C	21.5°C	13	14	15	16	17	18	19	
20.8	20.8°C	20.9°C	21.0°C	21.1°C	21.2°C	21.3°C	21.4°C	21.5°C	人深							

8月前半は水温が緩慢して、名古屋  
8月中旬に水温が20℃以上になると足込み

### 産卵器設置情報(FAX)

## **水産試験場の取り組み方針**

---

### **1 限りある水産資源を賢く、末永く利用する管理技術の開発と提案**

水産資源や海洋環境の状況を常に把握し、持続的に漁獲できるような管理方策について提言します。

### **2 県産魚付加価値向上に対する取り組み**

鳥取県の美味しい魚の市場価値を高めるためにブランド化を推進します。

### **3 燃油高騰に耐える漁業経営体への技術・研究支援**

燃油高騰の影響を受けやすいイカ釣り漁業やまき網漁業の経営が安定するよう、漁業者と協力して漁場探索をしたり、潮流情報の提供を行っています。

### **4 中海水産資源の回復方策の研究**

中海の浅場における出現生物の季節変化の把握とともに、特産種であるマハゼの畜養試験に取り組みます。

## **栽培漁業センターの取り組み方針**

---

### **1 栽培漁業の推進**

既に実用化した8魚種に加え、漁業者からの要望の強いキジハタとヒラメの栽培漁業技術の実用化や放流体制づくりを進めます。

### **2 魅力ある陸上養殖対象魚の創出**

魅力ある水産物を安定供給できる強い産地づくりに向け、マサバやキジハタ、アユカケなどの陸上養殖技術の開発と普及に努めます。

### **3 沿岸・内水面漁業重要資源の動向監視と増殖・管理技術の提示**

イワガキ・バイ等の重要な資源の増殖技術の開発・普及、ヒラメ・メイタガレイ・マダイ等の底魚資源動向の監視と管理方策の提言、ソディカ等回遊魚の漁場形成予測と情報提供に努めます。

### **4 収益性の高い漁業の導入支援**

燃油高騰、魚価低迷等により逼迫した漁業経営の改善を目指し、延縄による高級魚漁場の開拓や未利用海藻を活用した6次産業化の技術支援等、収益性の高い漁業の導入を進めます。

### **5 漁場環境の監視と修復技術の開発・普及**

沿岸・内水面漁場環境(水温・塩分・溶存酸素・赤潮・貝毒・餌料プランクトン・藻場等)の監視とともに、海域の藻場造成・湖沼のシジミ・渓流魚の資源回復技術の開発と普及を進めます。

## 【お知らせ】

2017年9月16日(土)に第6回 水産試験場 海と魚の学習日を開催します。ぜひお越しください(参考:昨年のチラシ↓)

# 第5回 水産試験場 海と魚の学習日

～見て、さわって、味わって～

・白イカの干物づくり教室  
(10:00~12:30に先着10組ずつ受付)  
・キジハタすくい、放流  
(11:30に先着30人受付)  
・タッピングプール  
(境港総合技術高校協力)  
ヒトデやお魚さわっちゃおう♪  
・スラリーアイス体験  
シャーベット状の冷たい氷にさわってみよう！  
・カニの甲羅積み競争  
ベニズワイの甲ら、何枚積めるかな？  
・展示水槽  
陸上養殖を進めているキジハタなど

・マグロ稀少部位と深海魚干物の試食  
(マグロ11:00 深海魚13:30 各30食)  
・ハタハタの美味しいさ試食  
鳥取県産ハタハタのおいしい理由を教えます  
・魚拓づくり体験  
アカガレイの魚拓をつけてみよう！  
・お魚めりえ  
小さなお友達もいっしょに♪ぬりぬり  
・お魚レントゲンクイズ  
何の魚の骨かわかるかな？  
・ハイテク船探検ツアー  
試験船「第一鳥取丸」を見学しよう！

【日時】9月17日(土) 午前9時30分~午後3時

【場所】鳥取県水産試験場 (雨天決行)

境港市竹内団地107

? (0859)45-4500 FAX(0859)45-5222

【駐車場等】駐車場 約30台

(公共交通機関でのご来場にご協力ください。)

身体障がい者対応トイレ、車いすスロープ 有り



このレポートに関するお問い合わせ先

海洋環境及び、沖合漁業、中海に関するこ

**鳥取県水産試験場**

住所 〒684-0046 鳥取県境港市竹内団地107

電話 0859-45-4500

ファクシミリ 0859-45-5222

E-mail suisanshiken@pref.tottori.jp

ホームページ <http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=72009>



沿岸漁業及び内水面漁業に関するこ

**鳥取県栽培漁業センター**

住所 〒689-0602 鳥取県東伯郡湯梨浜町石脇1166

電話 0858-34-3321

ファクシミリ 0858-34-2888

E-mail saibaicenter@pref.tottori.jp

ホームページ <http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=154053>

